



„Gut geschützt durchs Leben“

Empfohlene Standardimpfungen für Jugendliche (ab 16 Jahre) und Erwachsene nach **vollständiger** Grundimmunisierung im Kindesalter.

Folgende Impfungen werden laut STIKO (Stand August 2010) empfohlen:

Auffrisch-Impfungen:

Tetanus (Wundstarrkrampf)-Auffrischimpfung

im zehnjährigen Intervall

Diphtherie-Auffrischimpfung

im zehnjährigen Intervall

Pertussis (Keuchhusten)-Auffrischimpfung

bei der nächsten fälligen Td-Impfung (Tetanus/Diphtherie) einmalig eine Kombinationsimpfung

mit Pertussis,

zurzeit ist kein Pertussis-Einzelimpfstoff verfügbar

Poliomyelitis (Kinderlähmung)-Auffrischimpfung

einmalig nach zehn Jahren bzw. bei Reisen in Regionen mit Infektionsrisiko

Masernimpfung

für alle nach 1970 geborenen Personen über 18 Jahre eine einmalige Impfung gegen Masern,

wenn sie bisher nicht gegen Masern geimpft sind, nur einmal in der Kindheit geimpft wurden oder der Impfstatus gegen Masern unklar ist.

Rötelnimpfung

für ungeimpfte Frauen oder Frauen mit unklarem Impfstatus im gebärfähigen Alter

Varizellen (Windpocken)-Impfung

für ungeimpfte Jugendliche ohne Varizellen-Erkrankung in der Vergangenheit

HPV-Impfung (Humane Papillomaviren, Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs)

Impfung mit drei Dosen für weibliche Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr

Hepatitis-Impfung A/B als Kombinationsimpfstoff*

Grundimmunisierung mit drei Impfungen

Auffrischimpfung nach 10 Jahren und bei Reisen in Regionen mit Infektionsrisiko

FSME-Impfung („Zeckenimpfung“)*

Grundimmunisierung mit drei Impfungen

Auffrischimpfung alle fünf Jahre

Saisonale Gripeschutzimpfung*

Jährliche Impfung im Herbst

*Seit 1998 erweiterte Impfempfehlung für das Land Baden-Württemberg